

~~1775~~ Memoire Sur la luxation de
l'humérus, produite par cause externe.

par M^r Mothe, gradué, & membre du college
Roya^l de chirurgie de Lyon. n^o 15.

De toutes les maladies dont la guérison est soumise à
l'empire de la chirurgie, les luxations sans-contredit sont
celles où le secours de l'art est le plus nécessaire. ces
maladies ont été connues de tous les temps, elles ont même
fixé l'attention de plusieurs grands maîtres, et celle de
l'humérus a excité leur génie. Depuis près de deux mille
ans, nous voyons que dans tous les siècles, il y a eu des
hommes qui se sont occupés des progrès de l'art, et nous pouvons
dire que la chirurgie a atteint la perfection dans certains points;
mais pour la réduction de la luxation de l'épaule nous
ne sommes pas plus avancés que l'étoit Hippocrate;
cependant depuis le père de la médecine jusqu'à nos
jours, on a été fertile en machines, en moyens & en
procédés; malheureusement la plupart sont susceptibles d'incon-
veniens, et tous sont quelque fois insuffisans comme je vais
le prouver.

En 1775 étant chirurgien à l'hôtel-Dieu de Lyon,
j'ay vu un voyageur qui ayant versé dans une chaise de poste,
s'étoit luxé l'humérus; les chirurgiens d'une petite ville
aux environs de Lyon, où il fut porté après son
accident, firent diverses tentatives sans pouvoir la réduire;
un rhabilleur du pain fut appelé, il annonça d'abord, que

ARC 12, d. 8 n^o 1

par des connaissances qui lui étoient naturelles, il feroit ce que
 les chirurgiens n'auroient pas pu obtenir; en conséquence il se
 pourvut de cinq ou six compagnons les plus forts qu'il put se
 trouver, persuadé qu'il ne falloit que des extensions très fortes
 pour réduire la luxation; elles furent en effet si violentes
 que le malade en eut des convulsions, et se trouva mal de sa
 douleur: ils auroient sans doute arraché le bras s'ils n'auroient
 été arrêtés. Les aides de la chute, ou ceux des violents et
 moyens qu'on employa furent cause que le malade ne vint
 à Lyon qu'environ un mois et demi après son fâcheux
 événement; il fut transporté à l'hôtel-Dieu; c'étoit un
 homme fort et vigoureux, âgé de 36 ans, il avoit une
 luxation en bas, la tête de l'humérus étoit engagée sous
 le rebord de la cavité glenoïde de l'omoplate.

Le lendemain de son arrivée on fit des tentatives
 pour réduire la luxation, elles furent sans succès; cela
 donna lieu à une consultation des plus habiles chirurgiens
 de Lyon, tous furent d'avis qu'il falloit de nouveau essayer
 de faire la réduction; mais observant qu'il convenoit auparavant
 d'employer les relaxans sur toute la partie malade; bain,
 douche, fomentation, cataplasme et embrocation furent mis
 en usage pendant dix ou douze jours; alors M. M.
 les consultants se rassemblèrent et on procéda à de nouvelles
 tentatives: on commença à faire des extensions et contre-
 extensions avec les mains, nous étions trois ou quatre à
 pour chacun; les saufs furent mis en usage, les mouffles

3

Succédèrent, ensuite la machine de fétit, le billot, l'épaulé,
le bâton, etc. tout fut vain. le célèbre Pouteau étoit
à la veille de partir pour les eaux d'ais, il proposa au
malade de faire le voyage avec lui, en le flattant que les
bains et les douches des eaux thermales qui sont dans ce
pays, pourroient procurer du relâchement: alors il seroit possible
de réduire la luxation; cela fut encore sans succès et le
malade a resté estropié.

L'état fâcheux de ce malheureux à la fleur de
l'âge me fit faire les plus sérieuses réflexions, sur la
maladie et sur les secours impuissants de l'art. ayant vu
l'insuffisance des moyens les plus utiles, je cherchai d'abord
de découvrir la cause; j'avois si le défaut étoit dans les
moyens eux mêmes, ou dans la manière dont on les emploie.
après de mûres réflexions, je conçus que la plupart des
machines pouvoient être nuisibles et toutes insuffisantes:
soit par leur forme, ou par leur force, ou enfin par
la manière dont elles étoient employées; que tous les
autres moyens: comme mains, larges, et mouffles, etc.
n'étoient pas nuisibles, ils devoient être souvent insuffisants
aussi par la manière dont on les emploie; tandis que
l'extension bien dirigée avec les mains seules doit suffire
pour réduire toutes les luxations de humerus. les causes des
phénomènes dans les maladies se manifestent souvent par l'inspection
anatomique; et pour éclaircir mes conjectures je commençai par
faire des luxations sur le cadavre, ensuite je dissequai toutes
les parties environnantes de l'articulation, afin de juger plus

positivement du dérangement ou du désordre dans les parties, ainsi que
 de l'opposition qu'elles opposent pour la réduction de la luxation.
 DE
 mais avant de parler de ce qui a rapport au déplacement de l'os
 je croi qu'il convient de faire un exposé succinct des parties
 qui lient l'humérus à l'omoplate; afin de repandre un plus
 grand jour sur ce que j'ay observé.

L'os du bras est articulé en haut avec la cavité glénoïde
 de l'omoplate, par énothrodie; cette cavité est très superficielle
 et n'est pas proportionnée à la tête de l'humérus dans les os secs;
 mais dans le sujet vivant ou le cadavre, elle est recouverte d'un
 cartilage qui est plus épais vers la circonférence que vers le
 milieu. cette épaisseur du bord cartilagineux rend la cavité
 glénoïde plus profonde et plus étendue qu'elle ne paroit dans les
 squelette. quelquefois au lieu de l'épaisseur il se trouve une
 bordure aqueuse qui est épaisse sur la circonférence de la
 cavité, mince vers le fond, et qui a très peu de largeur. cette
 bordure est souple, glissante, et paroit d'une substance différente
 de celle du cartilage ordinaire. elle a quelque rapport avec
 le bourlet de la cavité cotyloïde. l'humérus enfin est uni à
 l'omoplate par le moyen d'un ligament capsulaire ou tunique
 ligamenteuse qui environne toute l'articulation après largement.
 depuis son attache autour du bord de la cavité glénoïde, il
 s'étend au tour du bord de l'hémisphère cartilagineux de la
 tête de l'humérus, et s'attache près de ce bord vers les
 fascettes musculaires de la grande tubérosité, et la fascette
 musculaire de la petite. ensuite il s'en éloigne de suite et
 s'élève en descendant comme par degrés sur le cot de l'os jusqu'à
 quelque distance plus bas que la portion inférieure de

Chemisphere cartilagineux. Dans tout ce trajet la capsule s'
 attache fortement à l'os, excepté au petit intervalle de l'
 tubérosité. elle forme ici un abougement comme un tuyau.
 L'antérieur. ce tuyau membraneux est la gaine du tendon
 inter-articulaire du biceps. le vrai ligament de cette
 articulation est en quelque façon de l'espace de ceux dont
 M. Winslow dit qu'ils paroissent être composés de deux
 sortes de ligaments fortement unis ensemble; savoir d'un
 ligament capsulaire qui environne tout à fait l'articulation, et
 de plusieurs vrais ligaments, qui s'étendent en espace et
 s'étendent sur le capsulaire, et se unissent fort étroitement.

il n'est point d'articulation où les mouvements soient
 si étendus ni si combinés; ces mouvements sont exécutés
 par neuf muscles 1°. le deltoïde, 2°. le sus-épineux, 3°.
 le grand dorsal, 4°. le grand rond, 5°. le grand pectoral,
 6°. le coraco-brachial, 7°. le petit rond, 8°. le sous-épineux,
 9°. enfin le sous-scapulaire.

Le deltoïde couvre le haut du bras, et forme ce
 qu'on appelle le moignon de l'épaule; il s'attache à la
 clavicule; à l'omoplate, son épine et l'acromion; de là il
 descend jusqu'au dessous du premier tiers de l'os du bras,
 où il va s'attacher par un gros tendon à la grande
 empreinte musculaire, sous la gouttière bicipitale.

Le sus-épineux est un muscle fort épais, placé à
 la partie supérieure de l'omoplate; il remplit et s'attache
 à la cavité ou fosse sus-épineuse, de là il va en diminuant
 pour s'attacher à l'os du bras, fasette supérieure de la tête.



Le grand dorsal, est un muscle large, mince, charnu pour la plus grande partie, situé entre l'aisselle, où il est fort étroit, et le dos, sur lequel il s'étend par des fibres ramassées en long et en large, depuis le milieu du dos jusqu'au bas de toute la région lombaire; il s'attache à six ou sept quelque fois huit apophyses épineuses des vertèbres inférieures du dos; aux apophyses épineuses de toutes les vertèbres lombaires; à l'os Sacrum; à l'os des iles; aux quatre fausses côtes inférieures; à l'angle inférieur de l'omoplate; ensuite toutes les fibres se ramassent en montant, et se concentrent sous l'aisselle, où elles se terminent, par un tendon plat contourné, qui s'attache vers le haut de la gouttière bicipitale.

Le grand rond, est un muscle longuet, épais et applati, situé un peu obliquement entre l'angle inférieur de l'omoplate et la partie supérieure du bras. il s'attache à la face externe de l'angle inférieur de l'omoplate, de là il se porte vers le quart supérieur de l'os du bras, où il s'attache le long de la gouttière bicipitale.

Le grand pectoral est un muscle assez ample, épais et charnu qui couvre le devant de la poitrine; ses attaches sont à la clavicule vers le sternum, au sternum, à toutes les vraies côtes, à la première des fausses, quelque fois à la seconde; les fibres charnues se ramassent en se portant vers l'aisselle pour former un tendon contourné qui s'attache à l'os du bras, au-dessous de la moitié de la gouttière bicipitale.

Le coraco-brachial est un muscle long, plat du côté interne de la moitié supérieure de l'os du bras, il est attaché

en haut a la pointe du bras coracoïde; ensuite il descend tout
 tout charnu et se rattache a la partie moyenne de l'os du bras.

Le petit rond est un muscle semblable a peu près
 au grand rond, il est placé au dessus; il s'attache par un
 bout a la côte inferieure de l'omoplate, de la il se porte en
 vers le haut du bras, ou il se rattache a la facette inferieure
 de la grosse tuberosité de la tête de l'humerus.

Le sous-épineux est un muscle triangulaire et charnu,
 il occupe toute la cavité ou fosse sous-épineuse de l'omoplate
 ou il s'attache, les fibres charnues se reunissent en une
 masse, qui passe sous l'acromion et par dessus l'articulation
 de la tête du bras, en s'attachant au ligament capsulaire,
 ou elle se termine par un tendon plat et large qui se
 rattache a la facette moyenne de la grosse tuberosité
 de la tête de l'humerus.

Le sous-scapulaire est un muscle de la même
 largeur et longueur que l'omoplate, il remplit toute la
 face interne de cet os ou il s'attache; les fibres charnues
 en se portant vers l'aisselle se reunissent pour former un
 tendon fort large qui est collé aussi au ligament capsulaire,
 et se rattache a la facette de la petite tuberosité de
 la tête de l'humerus.

Ces muscles font faire une infinité des mouvements
 au bras, et selon l'usage particulier qu'on leur attribue, le
 bras est élevé par les muscles deltoïde et sus-épineux; il
 est abaissé par le grand dorsal et le grand rond; il est
 porté en devant par le grand pectoral et le coraco-brachial;
 il est tiré en arrière par le petit rond, le sous-épineux et



le Sous-Scapulaire. outre en mouvement, le bras peut en faire une infinité d'autres, par les différentes combinaisons de ses muscles: par effet il peut se mouvoir selon toutes les lignes qui servent à lier du centre de la cavité de l'omoplate à la circonférence, et outre tout ce mouvement direct, il fait encore un mouvement en rond et un demi circulaire sur l'axe. le mouvement en rond ou mouvement de fronde se fait par la combinaison successive des muscles qui servent aux quatre premiers mouvements dont je viens de parler. le mouvement demi circulaire ou mouvement de pivot, dépend principalement de l'action des muscles pectoral, Sous-Scapulaire, grand rond, petit rond, Sous-épineux, et peut se faire dans presque tous les points d'élévation, d'abaissement, d'adduction et d'abduction du bras, et pendant le temps même que les autres mouvements se font. lorsque les muscles du bras agissant tous ensemble ils le tiennent solide et ferme en quelque point qu'il soit: c'est ce qu'on appelle mouvement tonique.

outre les muscles dont je viens de parler il y en a encore deux qui traversent l'articulation, savoir le grand ancone, ou long extenseur de l'avant-bras, qui prend origine à la partie inférieure du cou de l'omoplate et se termine au sommet de l'olecranon; et le coraco-radial ou biceps, dont l'une des têtes s'attache au bout de l'apophyse coracoïde de l'omoplate. l'autre tête ou tendon inter-articulaire suivant M.^r Winslow, s'attache au coté de l'omoplate au dessus de la cavité glénoïde, il se porte ensuite vers l'articulation, ou il est revêtu d'une gaine très courte, passe entre les tendons

CHIRURGIE
C

du Sur-scapulaire et du Sous-scapulaire, & entre dans l'articulation, passe immédiatement sur la tête de l'os du bras pour aller gagner la gouttière où il est recouvert ou enveloppé d'un gaine membraneuse, qui est une production du ligament capsulaire. Les deux corps charnus du biceps ainsi attachés séparément en haut par leurs tendons supérieurs, s'unissent étroitement au-dessus du milieu du bras, ou ils forment un tendon commun qui va s'attacher au bord postérieur de la tubérosité du cot du rayon.

il y a encore des vaisseaux sanguins, des lymphatiques & des nerfs qui passent sous le creux de l'aisselle pour aller gagner la partie interne du bras. le creux de l'aisselle est formé par l'éloignement des muscles pectoraux, des grands dorsal & grand rond. ce creux est rempli de beaucoup de graisse & de quelques glandes englobées.

par l'expose que nous avons fait sur la manière dont le bras est articulé avec l'omoplate & sur la grande liberté de tous ses mouvements; on doit juger de la faiblesse qu'il auroit s'il n'etoit l'exercice si la nature ni avoit ajouté quelques moyens auxiliaires pour rendre la connexion plus solide, premierement en disposant la plupart de muscles de manière que leur tendon embrassent fortement la plus grande & partie de l'articulation; secondement en plaçant au-dessus de cet articule, une espèce de seconde coque ou retraite formée par la jonction de l'acromion avec le bout de la clavicule, par l'apophyse coracoïde, qui la borne du côté interne, & enfin par des forts ligaments, qui de cette apophyse,



ACADEMIE ROYALE
de Médecine
CHIRURGIE

Importance a l'anatomie et a la clinique; dans le lieu
de leur jonction
Nous en details bien réfléchis, de viennent importants

pour ne pas être entraîné dans l'erreur de Galien et de la
plupart des auteurs après lui, qui prétendaient que la tête
de l'os du bras peut se luxer, en différents endroits. mais
après avoir considéré la structure de cet article et la
disposition des parties qui l'environnent, il est aisé de
convenir que le bras ne peut se luxer qu'en bas. malgré
la certitude de cette remarque j'ai fait faire part des
expériences que j'ai faites sur le cadavre; comme ^{devant} nous
servir de guide, non seulement pour connaître les différentes
espèces de luxation, mais encore pour savoir le désordre qu'elles
causent, pour démontrer le danger ou l'inconvénient des moyens
qu'on emploie pour les réduire, et enfin pour indiquer
un procédé simple que la nature nous trace.

Le cadavre intact, je commençai par faire des
luxations du bras; quelque effort ou quelque violence que
j'employasse je ne pus faire des luxations qu'en bas; il falloit
encore que le bras fut élevé a un plan horizontal, faisant un
angle avec le tronc, dans cette situation avec une impulsion
violente sur le bras près de l'articulation tandis qu'il
étoit soutenu vers le coude, je faisais glisser la tête de
l'humérus sous l'aisselle; plus le bras étoit élevé, plus
il étoit aisé de le luxer; lorsqu'il étoit relevé a la ligne
perpendiculaire, c'est à dire près de la tête il falloit une
moindre impulsion; et en le forçant au delà de cette

11
ligue on le luxoit encore. pour faire des luxations dans
un autre sens, il falloit que le bras fut rapproché du
tronc, pour lors je ne pus jamais en venir a bout, l'au-
tant des fractures et des déchirures qui seroient plus
dangereuses que la luxation.

La luxation faite, je distinguai toutes les parties
qui environnent l'articulation, voici ce que j'ay observé!
1.^o toujours luxation complète; 2.^o la tête de l'humérus
étoit sortie vers la partie inférieure de la cavité glénoïde;
3.^o déchirure au ligament capsulaire, a travers laquelle
la tête de l'os avoit passé; 4.^o une seule fois rupture au
tendon inter-articulaire du biceps, deux fois a celui du
grand ancone ou long extenseur de l'avant-bras; quelquefois
déchirure a la partie charnue ou réunion des deux têtes
du biceps, quelque fois a la gaine membraneuse qui
enveloppe le tendon inter-articulaire. D'après ce que je viens
de dire la luxation se faisoit a peu près toujours en
bas; mais lorsqu'elle étoit faite, et qu'on faisoit faire des
mouvements violens au bras, la tête glissoit sous le col de
l'omoplate, ou elle se portoit plus ou moins en devant sous le grand
pectoral, ou en derrière de l'articulation sur la côte de
l'omoplate, ou en dehors de cette côte, ou bien en dedans.
Voilà sans doute ce qui a fait dire a la plupart des
auteurs qu'il y avoit plusieurs especes de luxation;
certains comme Galien, Col de Villars, etc. distinguant
quatre especes de luxation de la tête de l'os du bras,
savoir en haut, (ou suivant Paré, en la partie supérieure,)

en bas, en devant, et en derrière. L'autre comme Petit,
ACADEMIE ROYALE
CHIRURGIE ~~lequel~~ ^{recommencent} encore quatre especes de luxation;
 lequel en bas, en dehors, en dedans, et en devant. mais le
 C. Pypperaute exact observateur avoue de bonne foi qu'il
 ne jamais vu la luxation du bras qu'en dedans; et
 Du Verney pour soutenir l'autorité de pere de la medecine
 dit, „ il est aisé d'entrer dans son sentiment quand on reconnoit
 combien il est difficile quelle se puisse faire en dedans, en
 derrière et en devant; a moins que les parties solides qui
 composent l'articule ne soient rompuës, et les muscles qui
 l'environnent debiles; car pour lors il n'y a rien d'impossible. „


„ Si ceux qui ont contredit ce sentiment avoient
 bien examiné le terme du depart de l'os, c'est a dire la
 cavité d'où il doit sortir, la violence qui le fait sortir, et la
 situation où se trouve le malade au moment de la
 luxation, ils auroient facilement reconnu leur erreur;
 car il faut bien remarquer qu'il y a une très grande
 difference entre la manière dont se fait la dislocation et
 la situation où se trouve l'os après quelle est faite.
 cependant c'est en cela que consiste le coup de maître pour
 réduire avec sûreté toutes les luxations, et c'est ce qu'on ne
 peut bien savoir qu'en bien interrogeant le malade,
 si c'est par un coup, ou par une chute que l'accident est arrivé. „

„ pour que la tête de l'os du bras se luxe en dedans,
 en devant, ou en derrière, il faut que dans l'effort, ou dans
 la chute, le bras malade ne soit pas fort écarté d'un
 côté, et que le poignet, ou le coude, porte a plomb et en

13
ligne droite, soit de bas en haut, soit de derrière en devant,
ou de devant en derrière. »

» Or dans toutes ces situations la tête de l'os du bras
portera toujours ou contre l'acromion, ou contre l'apophyse
coracoïde, ou contre le milieu de la suture qu'ils forment. —
S'il est poussé directement en haut, les apophyses coracoïdes et
l'acromion, les ligaments et les attaches du deltoïde, s'opposent
à cette luxation. S'il est poussé en dedans l'acromion s'y
oppose; et si l'os est en dedans, la tête de l'os est arrêtée par
une tête du biceps, par le coraco-brachial, et par l'apophyse
coracoïde; ces obstacles sont très puissants, et pour que la
tête de l'os sorte de la cavité en ce sens-là, il faut la
vaincre. »

Ces sont toutes ces considérations vraisemblablement
qui ont fait dire à Fabrice d'Aquapendente: Humerus
ne peut se démettre que vers l'aisselle, c'est à dire, en bas,
par ce que la ne se trouvent aucunes d'effence, comme aux
autres endroits, mes expériences sur le cadavre ont confirmé
l'observation d'Hippocrate, et les remarques judicieuses
de Fabrice d'Aquapendente et de Pudernoy, puis que
toutes les luxations furent en bas, c'est à dire que la tête
de l'humerus sortoit vers la partie inférieure de la cavité
glenoïde; ensuite la tête étoit déplacée, comme je l'ay
dit, toujours en raison des mouvemens que l'on faisoit
faire au bras après la luxation; mais de ce déplacement
consequent doit on conclure qu'il y a plusieurs espèces de
luxations, je crois que non, par ce que lorsque le bras



est luxé en bas, la luxation est parfaitement caractérisée et ne change de nom quoique la tête de l'humérus change de place. Du Vernier n'a pas osé suivre le jeu du préjugé que lui avoient imposé la plupart des auteurs qui ont distingué plusieurs espèces de luxation; car il a dit ~~avec complaisance~~ ~~arbitrairement~~: Je ne nie pourtant pas que la luxation du bras ne se fasse en devant, & quelque fois en derrière, mais la tête de l'os sort toujours en dedans. Je vais supposer qu'après la luxation en bas, la tête de l'humérus est portée en devant, il faudrait donc dire luxation en bas & en devant; cela ne doit pas être, par ce qu'il ne peut pas exister deux luxations à la fois. Or! d'après ce que je viens de dire il parait que la question de M. DuJardin! (a) De ce que la tête de l'humérus ne sort point en devant, on s'enfuit il qu'il n'y a point de luxation en devant? est décidée; par ce que deux luxations ne pouvant pas exister à la fois, il doit en suivre que toutes les fois que la tête de l'humérus sortira de la cavité glénoïde, vers la partie inférieure, il y aura luxation en bas. ce caractère de maladie ne peut point changer malgré tous les déplacements conjoints de la tête de l'humérus; mais si cela arrive on doit dire, luxation en bas avec déplacement en devant, en derrière, &c. cette remarque me parait essentielle pour connaître parfaitement la maladie & pour indiquer les vrais moyens curatifs. si mon raisonnement n'est pas ^{clair} clair, J'espère que le traitement que j'indiquerai servira à prouver jusqu'à l'évidence que les luxations se font à peu près toutes en bas.

(a) hist. de la chir. tom. I. pag. 246.

13
on peut objecter qu'il est ^{facile} qui peut faire connaître les
différences dans les luxations! ce ^{sont} sont les signes commemo-
ratifs, en informant de la cause de la luxation, de la
situation du corps et surtout de celle du bras lorsqu'elle a
été faite, et enfin si le bras a changé de situation depuis
le moment de la luxation. si cela ne suffit pas l'auteur en
l'indiquant un moyen infailible! lorsque dans mes expériences
sur le cadavre, j'avois fait la luxation en bas, et qu'ensuite
par des efforts quelconques j'avois déplacé la tête de l'humérus
en devant, en derrière, etc. Je la ramenois aisément en bas
en élevant plus ou moins le bras. cela doit paraître clair et
vrai à tout le monde: par ce que j'ay dit que dans toutes les
luxations j'avois observé une déchirure au ligament capsulaire
à travers laquelle la tête de l'os avoit passé. or! la
déchirure du ligament étant en bas, et embrassant la
portion d'os qui y est engagée, doit nécessairement le rendre
fixe dans ce point, tandis que la tête doit être ramenée
sans laiselle à mesure qu'on relève l'extrémité inférieure.

Les signes commémoratifs avons nous dit, doivent
donner la connaissance des luxations; mais pour pouvoir
apprécier ces signes, et s'en faire une juste idée, il est
important de savoir que les causes externes des luxations
de l'humérus sont les coups, les chutes, les efforts, etc.
dont la direction détermine conjointement avec la situation
du bras l'espèce et les différences; mais ajoutons que
Du Verney fait observer que le bras ne se luxé ordinairement
que quand il est écarté des côtes; le célèbre Petit a qui

rien n'échappoit par la sagacité de ses connaissances de voir affirmativement en disant, il faut encore remarquer, que le bras ne se luxé jamais tant qu'il est appliqué contre la poitrine; mais expérimen sur le cadavre & plusieurs observations sur le vivant mont convaincu de cette vérité.

Etayé des autorités d'Hippocrate, de Fabricius Baguapenspendente, de Bëtit, de Duverney, &c. & convaincu par l'expérience, je dis que la luxation du bras se fait à peu près toujours en bas; par conséquent l'état du malade ou la situation de la partie ne doivent pas toujours être des indices sur pour connoître la luxation, puisque la tête de l'os du bras se trouve quelque fois placée en devant, en derrière, &c. tandis que la luxation s'est faite en bas. ainsi, les signes que les auteurs ont indiqués pour distinguer les différentes espèces de luxations, ne peuvent guere servir que à faire connoître que la tête de l'humérus est sortie de la cavité glénoïde; mais comme il est quelque fois très-difficile de reconnaître ce déplacement, il est important d'exposer tous les signes: ils sont communs ou propres; les premiers sont la douleur & la privation entière, ou partielle, du mouvement du bras; la douleur est un signe fort équivoque; parce que si toute partie luxée est douloureuse, toute partie douloureuse n'est pas luxée, attendu que la douleur d'une partie peut venir de plusieurs autres causes. Secondement on remarque un changement dans la figure & la situation de la partie luxée, quand on la compare avec la partie saine; cependant Hippocrate fait observer que le changement de figure ne constate pas toujours la

luxation; car il raporte avoir connu d'assez habiles ¹⁷
médecins, qui croyoient, contre la vérité, que l'humérus étoit
luxé, par ce qu'ils observoient que la partie supérieure
de l'articulation étoit déprimée & creusée; ils ne faisoient
pas attention que cela ne venoit que du dérangement de
l'apophyse acromion, & qu'il n'y avoit point de tumeur
à la partie opposée, par la présence de la tête de l'os
déplacée. Galien dans ses commentaires sur Hippocrate,
avoue qu'il arriva à peu près la même chose à son
égard, il eut l'articulation de l'acromion avec la clavicule
mise dans un tournoi; le maître du tournoi apprenant
dans cet endroit une cavité qui n'étoit pas naturelle, crut
que la tête de l'humérus étoit luxée, & qu'elle étoit
tombée sous l'aisselle; dans cette idée il lui tiroit
vigoureusement le bras & cherchoit de réduire la prétendue
luxation, mais en vain; on crut que l'extension n'étoit pas
suffisante; quelques autres personnes s'employèrent pour
aider à la faire plus forte, pendant que Galien lui
même tenoit avec les doigts de l'autre main la réduction
de l'os: étant cependant apperçu qu'il n'y avoit rien
d'extraordinaire dans le creux de l'aisselle, c'est à dire
point de tumeur, point d'empâtement, il reconnut qu'il n'y avoit
point de luxation. il voulut faire cesser les extensions,
ceux qui les faisoient s'imaginèrent que c'étoit la crainte
des douleurs qui le faisoit parler ainsi, les continuèrent malgré
lui, & si un autre médecin plus prudent qu'eux n'étoit survenu
& ne les eût point fait arrêter, ils lui auroient peut-être

Debris les muscles. malogé tout cela la luxation n'existe
 sans un changement à la partie plus ou moins
 sensible à la vue et au toucher. en effet il paroît une
 tumeur à l'endroit où la tête de l'os est placée, et un
 enfoncement à l'endroit de la cavité; mais il est quelque-
 fois très difficile de reconnaître l'un ou l'autre, à cause
 d'un gros emboussant, ou d'un engorgement considérable et
 survenue à la suite d'une grande contusion. troisièmement,
 le bras luxé est, ou plus long, ou plus court, et il y a une
 différence de la partie malade à la partie saine. les
 signes particuliers annoncent le lieu que la tête de l'humérus
 occupe; lorsqu'elle est en bas, outre l'élévation et le vuide qu'on
 sent sous l'acromion, qui est plus prominent qu'il ne doit être,
 et la tumeur que forme sous l'aisselle la tête de l'os
 déplacée; le bras est plus long et plus écarté des côtes
 par la tension du deltoïde et du sus-épineux, dont les
 attaches sont plus éloignées; c'est de là que dépend la
 douleur que l'on cause au malade, lorsqu'on approche son
 bras des côtes, et le soulagement qu'on lui procure en
 l'éloignant. l'avant-bras est un peu fléchi, à moins qu'il n'y
 ait rupture à un tendon du biceps, ou à la gaine
 qui le cache; si on vouloit le fléchir d'avantage, on
 cause de la douleur, par ce qu'on augmente la tension
 du muscle long extenseur; si on vouloit le tendre tout à fait,
 on cause de la douleur, par la tension du biceps. Dans
 la flexion on sent la douleur tout le long de la face postérieure
 du bras, au lieu que dans l'extension la douleur est tout

tout le long de la partie antérieure.

Après que la luxation est faite en bas, la tête du bras se porte en devant; le bras est tantôt plus long, tantôt plus court: ce qui dépend de la situation plus ou moins élevée de la tête de l'os, par dessous le grand pectoral; si elle n'est guère élevée, le bras est plus long, il est écarté des côtes & le coude porte en arrière, par la tension des portions externe & postérieure du muscle deltoïde; si au contraire elle est bien élevée, alors on sent un engourdissement au bras & à l'avant-bras, par la compression qu'elle fait sur les vaisseaux & sur les nerfs; le bras est plus court, il est rapproché de la poitrine par la tension des muscles petit rond, sous-épineux, sous-scapulaire, grand dorsal & grand rond; ces deux derniers tirent encore le coude en arrière, au lieu que les trois premiers font faire au bras un mouvement de devant en dehors qui écarte la main de la poitrine; l'avant-bras est peu fléchi, & les mouvements sont plus libres que quand la tête est plus bas. quand la tête de l'humérus se porte en arrière, le bras est ordinairement plus long; il est élevé par le deltoïde; le coude est porté en devant par la tension des muscles grand pectoral, du coraco-brachial & par la portion antérieure ou claviculaire du deltoïde; l'avant-bras est bien fléchi à moins qu'il n'y ait des ruptures aux tendons du biceps, ou à la gaine ligamenteuse; la main est rapprochée de la poitrine.

La luxation du bras est une des plus faciles, elle est aussi une des moins dangereuses; lorsqu'il n'y a que

que luxation, (nous avons dit qu'elle se fait à peu près toujours au bras,) elle ne cause point d'autre accident que le défaut de mouvement; elle est fort aisée à réduire tant ancienne que récente. lorsque la tête de l'humérus est bien enfoncée dans le creux de l'aisselle, ou sous le cot de l'omoplate, l'Étiet et Du Vernier s'accordent à dire que la réduction en est très difficile! l'expérience m'a appris le contraire, c'est ce que je prouverai par l'observation. la réduction faite la luxation récente sera plutôt guérie que l'ancienne; mais si la luxation est avec déplacement en devant, elle expose à plus d'accident, en raison du plus ou moins de déplacement: par la déchirure du ligament capsulaire et des petits vaisseaux; ou par la compression des vaisseaux axillaires, des nerfs, ou autres en partie environnantes; ce qui cause de la douleur, de l'engorgement, et un engourdissement au bras, à l'avant-bras et à la main; ou donne lieu à une échimose, ou à une contusion plus ou moins étendue; alors la réduction doit se faire le plus tôt possible, et quoiqu'un petit din qu'on y réussit difficilement, elle se fait tout de même avec les mains moyennant quelques précautions dont je parlerai dans les extençons; la réduction faite, la guérison est plus longue, mais alors on remédie ~~plus~~ facilement aux accidents. quand la luxation est avec déplacement en derrière elle cause moins d'accident qu'en devant, et elle est aussi plus facile à réduire. tous les déplacements doivent et peuvent être remis; et si Du Vernier a dit, et les vieilles luxations ~~luxations~~ du bras sont très difficiles à réduire: il s'en rencontre même où l'on ne doit rien en

les accidens avant de tenter la réduction. Dans tout autre cas où le déplacement de l'os est la cause des accidens, il faut le réduire le plutôt possible par la raison que l'ablatio
causae tollitur effectus.

La réduction de la luxation du bras se fait par le moyen de l'extension et contre-extension; ces deux mouvemens opposés, bien dirigés, doivent réduire la luxation sans accident, parcequ'on ne doit les faire qu'avec les mains; leur insuffisance dans la plupart des cas jusqu'à ce moment a fait recourir à des moyens plus forts et plus violens: comme laogs, mouffles, et machines de diverses manières, encore étoient ils aussi quelquefois insuffisans! voilà précisément ce qui détermine mes réflexions & mes recherches. J'ay dit que dans mes expériences sur le cadavre, la luxation étoient à peu près toujours en bas, et que je n'avois pas pu en faire dans un autre sens: sans causer des ravages qui auroient été plus dangereux que la luxation; en conséquence je me bornerai à ne parler que de la luxation en bas, persuadé qu'elle se font toujours à peu près dans ce sens. mais supposé qu'il y ait quelque exception à cette règle, les principes que j'aurai établis pourront être appliqués dans tous les cas.

Lorsque j'ay vu luxé le bras, en suite dislégué les muscles qui le mouvoient sur l'épaule et mis à découvert les ligamens qui le lient à l'omoplate, la luxation étoit en bas, j'observai que les muscles deltoïdes, le sur-épineux, le biceps & la portion supérieure du ligament capsulaire

étoient tendus. quand la tête de l'humérus étoit déplacée
 en devant, main guère élevée, les muscles sur-épineux, les
 portions moyenne & postérieure du deltoïde, la longue tête
 du biceps & la portion supérieure & postérieure du ligament
 capsulaire étoient tendus; quand elle étoit bien élevée, on
 les muscles petit rond, le sous-épineux, le sous-scapulaire,
 le grand dorsal, le grand rond & la portion postérieure du
 ligament capsulaire étoient tendus; quand la tête de
 l'humérus étoit déplacée en derrière, les muscles coraco-bra-
 chial, les portions moyenne & antérieure du deltoïde, le grand
 pectoral, la longue tête du biceps & la portion supérieure
 & antérieure du ligament capsulaire étoient tendus. pour
 réduire la luxation, la tête étoit simplement en bas,
 j'étois de même en usage tous les moyens connus;
 Je ne puis pas juger de leur effet comme si les parties
 avoient été dans leur ensemble & vivantes; mais j'en
 jugeai par comparaison; en conséquence je commençai
 par faire des extensions le bras un peu élevé, j'aperçus
 que tout l'effort portoit sur la portion supérieure du ligament
 capsulaire, sur les muscles deltoïde, sur-épineux & le
 biceps; si je rapprochois le bras d'avantage du tronc la
 tension de ces parties devenoit plus forte; au lieu que
 si je relevais le bras en faisant l'extension, la résistance
 devenoit moindre, au point que le bras relevé près de la
 tête, ou relevé dans une ligne perpendiculaire, (en supposant
 le corps debout,) alors avec le plus petit effort pour



rien entreprendre de crainte de causer des accidens fâcheux
au malade, que dis-je ! il y en a qui sont absolument incurables.

5 L'observation que j'ai rapportée au commencement semble
confirmer cette opinion; est parce que les extensions étoient
mal dirigées; les lauz & autres machines, étoient non
seulement insuffisantes, mais encore ces moyens causent des
douleurs vives, des contusions, des échymoses, des excoriations,
des déchirures à des portions de muscles & de ligaments.
maintenant j'espère prouver que toutes les luxations de
bras sont curables, (Surtout d'après la réduction d'une
luxation de cuisse qui avoit été méconnue pendant deux
ans; (a)) & que les mains seules doivent suffire dans
tous les cas.

La luxation de l'épaule indique trois choses
à remplir pour la cura; la 1.^e consiste à réduire la
luxation; la 2.^e à la maintenir réduite; & la 3.^e à
corriger les accidens présents, & prévenir ceux qui pour-
roient survenir. Des complications empêchent quelquefois
de remplir la première! par exemple si le bras
étoit rompu proche de son articulation supérieure, il
faudroit absolument abandonner la luxation jusqu'après la
guérison de la fracture; S'il y avoit un engorgement avec
inflammation & douleur plus ou moins considérable provenant
de la cause de la luxation, il conviendrait encore de combattre

(a) cette observation fait le sujet d'un mémoire fort intéressant
par M. Guignot, inséré dans la collection de l'Académie
royale de Chirurgie. tome XV.




l'extension, la tête de l'humérus rentrait dans la cavité sans éprouver aucune résistance. au lieu que quand je voulais faire les extensions dans un autre sens, comme pour me servir de l'échelle, de la porte, du pied, de l'épaule, du baton, du talon sous l'échelle, etc. j'étais obligé en faisant l'extension de rapprocher le bras du tronc, alors j'augmentais la tension et causais quelque fois des douleurs plus ou moins violentes aux parties qui opposent de la résistance pour la réduction, mais que j'ai dû éviter en relevant le bras, malgré les inconvénients dont nous venons de parler, tous ces moyens ont encore celui de ne pas pouvoir déplacer la tête de l'humérus lorsqu'elle est engagée sous le cot de l'omoplate; et si elle est placée en devant, en derrière etc. ou cause des ravages considérables à l'articulation. L'ambly d'hyppocrate, la commencement de flecta, les machines de Michault, de Petit et d'autres dont il est fait mention dans les ouvrages de Junker, Surmann, etc. ont les mêmes inconvénients, parce qu'elles font les extensions en rapprochant le bras plus ou moins du tronc.

Les extensions et contre-extensions que l'on a fait jusqu'à présent avec les mains, les larges et les moufles, méritent quelque réflexion, quoique ces moyens fussent plus favorables que tous ceux dont nous avons parlé; parce que lorsqu'on en faisoit usage on relevait le bras dans un plan horizontal, faisant un angle avec le tronc; dans cette situation on relâchait les parties, au point que si le sujet étoit faible, ou d'une constitution lâche, et que la luxation fût en bas et récente,

Elle étoit ordinairement réduite. mais si au contraire le sujet
 étoit robuste avec des muscles forts & vigoureux et que la
 luxation existât depuis quelque temps, alors ces moyens
 étoient encore insuffisants pour ramener la tête au niveau
 de la cavité: à cause de la résistance des parties tendues,
 mais qu'on auroit relâché en relevant d'avantage le bras.
 La tête de l'humérus étoit encore quelques fois ramenée
 au niveau de la cavité sans être réduite, parce que les
 extenſions étoient mal dirigées, ou par ^{le défaut de la} la conformation; un
 moyen auxiliaire que les auteurs recommandent pour
 la réduction des luxations, mais que nous prouverons
 être inutile. les cas où les extenſions quoiqu'elles suffisantes
 mais mal dirigées, avec la conformation qui empêche
 la réduction de l'humérus, viennent de l'erreur de presque tous
 les auteurs, et de tous les gens de l'art après eux qui croient
 que le bras peut se tordre en avant, en derrière et en bas;
 d'après cette persuasion ils établissent sur des principes
 certains qu'il faut faire rentrer la tête par où elle est
 sortie. mais lorsque la tête de l'humérus est déplacée
 en derrière, ou en devant un peu haut ils croient qu'elle
 est sortie de la cavité dans le sens où ils la trouvent
 en conséquence ils font faire des extenſions suffisantes, et
 en même temps le chirurgien avec ses mains, ou avec
 une serviette, laquelle embrasse son cou et le bras malade,
 fait tous ses efforts pour faire rentrer la tête dans
 la cavité; mais le ligament capsulaire oppose une résistance






Dans ce point, tantin que si on rameneroit la tête en bas elle rentreroit dans la cavité par ou elle est sortie.

D'après tout ce que j'ay dit on voit converger qu'il ne faut pas de grandes extensions, & qu'on n'a pas besoin d'aucun moyen violent pour les faire, il faut seulement qu'elles soient bien dirigées en mettant les parties dans des situations convenables. Tous les auteurs ont senti la nécessité de ces situations & pas un ne les a mises en pratique? S'étant dit, dans la vue générale des luxations, il faut que la partie soit tellement située que les muscles soient également tendus, sans quoi ceux qui seroient le plus en contraction, feroient trop de résistance & diminueroient la force de l'extension, outre qu'ils pourroient se déchirer; Dans un autre endroit il dit encore, il faut que les muscles soient relâchés autant qu'ils peuvent l'être. De Verney dans la vue générale des luxations, dit aussi, il faut donner à la partie une telle situation que les muscles soient également tendus; autrement ceux qui seroient plus fortement bandés opposeroient trop à l'extension, & même pourroient se déchirer. La pratique de ces deux auteurs n'est pas conforme à leurs principes, puisque dans les procédés qu'ils indiquent pour la cure de la luxation de l'humérus, le bras n'est jamais élevé au dessus du plan horizontal, au contraire il est toujours au dessous de cette ligne en rapprochant du tronc; par conséquent lorsque la luxation est simplement en bas l'effort des extensions s'applique sur les muscles deltoïde, le sur-épineux, le biceps, & sur la portion supérieure du ligament capsulaire; & si la luxation est avec

27.
Déplacement en devant, ou en derrière: l'effort porte sur les parties
que nous avons dit être tendues par le déplacement de l'os.



M. F. dit dans les principes généraux qu'il a donné pour
la guérison des fractures & des luxations; dit, la position
la plus avantageuse pour réduire l'os doit être celle dans
laquelle les muscles les plus disposés à résister sont mis
dans le plus grand relâchement possible. mais lorsqu'il fait
l'application de ce principe pour réduire la luxation de
l'humérus, il s'écarte du sens générique qu'il a donné, en
disant: 1.^o „ pour réduire un os luxé, il faut que la force
de l'extension porte sur l'extrémité inférieure de cet os, & non
pas sur celui qui est au dessus; parce que si on la faisoit sur
l'os contigu, la force se partageroit sur les ligaments de deux
articulations & par conséquent seroit presque inutile. 2.^o il
faut connaître tous les muscles & les tendons qui font mouvoir
les articulations ou qui les avoisinent; parce que la simple
situation du membre qui est au dessus de l'os luxé, relâche
ou distend les parties qui ont quelque connexion avec la
jointure disloquée, & par conséquent cette situation fait
seule la moitié de la réduction; mais pour cela M. F. dit,
n'indique que les moyens & les procédés connus; il ajoute
seulement qu'il est impossible de réduire l'humérus luxé
en faisant étendre le bras & l'avant-bras horizontalement,
il faut au contraire que l'avant-bras soit toujours plié
quelle que soit la méthode qu'on emploie, parce que la
longue tête du biceps offre une résistance considérable
quand l'avant-bras est dans l'extension. M. F. dit encore,

Dans la luxation de l'humérus en devant, la tête étant située sous le grand pectoral la réduction devient très difficile, lorsqu'on fait étendre le bras & qu'on le porte en arrière, ce qui distend & tire le muscle; tandis qu'au contraire la réduction se fait aisément en portant le bras en devant, situation qui relâche le muscle grand pectoral., ces principes sont opposés à ceux que nous avons établis d'après l'inspection des parties pour les signes de la luxation de l'humérus, puisque nous avons dit que dans la luxation avec déplacement en devant, la tête un peu haut sous le grand pectoral, le bras étant rapproché de la poitrine par la tension des muscles, petit rond, sous-épineux, sous-scapulaire, grand dorsal & grand rond; & ces deux derniers tirent encore le coude en arrière. Or tous ces muscles étant tendus le grand pectoral doit être dans le relâchement conséquemment les procédés de M.^r Sot, sont contraires aux principes qu'il prescrit & que la nature indique.

M.^r Dupoué a lu à l'Académie de Chirurgie quelques observations sur la luxation du bras par lesquelles il prouvoit qu'il en avoit fait la réduction en faisant lier le bras par le poignet; qu'il n'avoit employé que la force des mains d'un homme seul pour faire l'extension; & que sans contre-extension, il avoit réduit la luxation avec autant de facilité que de promptitude. cette méthode est tout à fait opposée à celle de M.^r Sot, qui suivoit les principes du célèbre Fellet & autres, qu'il faisoit autant qu'il étoit possible que les forces de l'extension & contre-extension fussent appliquées aux parties mêmes qui sont luxées. M.^r Dupoué en s'éloignant de ces préceptes, se

26
bonna affaire observer que la contraction spontanée des
muscles. Dans les luxations, n'étoit pas aussi considérable qu'on
le croyoit, et qu'une force très médiocre pouvoit la réduire.
mais pour qu'une force si médiocre, appliquée au bras
du coude, ne donneroit elle pas, pour la réduction, les mêmes
faiblesses qu'appliquée sur le poignet? M.^r Fabre (a) dans
ses remarques sur les luxations de la cuisse et du bras a cherché
à en donner la raison. on sait fort ce savant chirurgien que
les muscles grand pectoral et grand dorsal sont attachés
d'un côté au tronc, de l'autre ils se terminent par un
tendon commun, qui s'attache à l'humérus, environ au
bas du premier quart de sa longueur, forment avec cet os
une espèce de potence sur laquelle on appliquoit le lacq
destiné à faire la contre-extension, ce lacq devoit opposer
une résistance qui empêchoit l'os de descendre lorsqu'on
tirait. on sait aussi que deux muscles qui sont mou-
lés sur le bras, et à dire le biceps et le grand
anconé, sont attachés d'une part à l'omoplate et de l'autre
aux os du bras: ainsi, M.^r Fabre croit que le
lacq qu'on appliquoit au-dessus des condyles de l'humérus,
embrassoit ces deux muscles et qu'on leur faisoient souffrir
une extension violente avant que de faire descendre l'os;
(ou de le déplacer;) de sorte que les machines les plus
puissantes tendoient plutôt à rompre l'attache des muscles
qu'à réduire la luxation. M.^r Rouleau (b) a donné une
autre théorie, en disant: "il ne faut pas chercher à réduire

(a) Essai de physiologie.

(b) Oeuvres posthumes Tom. II.

la résistance des muscles par des extenseurs trop prompts et trop
 violents; et cherchera les soutenir après longtemps pour voir s'il
 y a une grande et vive résistance des muscles affaiblis et tombés
 enfin par la suite dans le relâchement dont on doit profiter
 pour obtenir la réduction. mais on doit supposer que le membre
 luxé est dans une direction combinée, de manière qu'aucun des
 muscles ne soit en état d'opposer plus de résistance qu'un autre.,"

" Les forces musculaires d'un membre étant également
 balancées les unes par les autres; dans les muscles qui environnent
 l'articulation luxée, peut-être faudroit-il, pour rendre encore
 leur résistance plus faible, faire une sorte de diversion à
 leur force contractile et à la sensibilité du malade ainsi,
 dans la luxation du bras, si on tire par le poignet, et non
 par le coude; le membre luxé, les muscles de l'avant-bras
 entrent machinalement en contraction; et alors la contractilité
 des muscles du bras en est plus faible. il se fait un partage
 de résistance dans tout le membre, de manière que la force
 de résistance qu'opposent les muscles de l'avant-bras et du
 poignet, est en diminution de celle qu'on auroit trouvée
 dans les muscles du bras, s'ils avoient seuls été attaqués.
 par des extenseurs faits au dessus du coude par conséquent
 dans la méthode de M. Dupoué le plus grand avantage
 ne peut consister que dans l'affaiblissement de la résistance
 des muscles du bras, qu'entraîne nécessairement la contraction
 opposée des muscles de l'avant-bras et de la main; et il
 arrive que, par la contraction simultanée et involontaire
 des muscles de tout le membre que l'on tire par la main,
 toutes les articulations forment, au moment de l'extension, et

une espèce de pièce continue.,,

ANALYSE DE LA THÉORIE
DE
CHIRURGIE
Les deux théories sont une preuve du génie de ces deux
savants chirurgiens, mais elles ne sont pas suffisantes, et
pour prouver l'avantage des extensions faites par le poignet,
sur celles faites par l'extrémité inférieure du bras; par ce-
que l'une et l'autre ont le même avantage; et à quel je
prouverai par le raisonnement et par l'expérience.


Ne connaissant pas les directions que M. Dupouy met en
usage dans les extensions, je ne puis pas analyser sa méthode;
mais je ferais seulement observer, qu'il me paroît difficile
pour ne pas dire impossible que M. Dupouy puisse réduire
certaines luxations de l'épaule sans faire de contre-extension,
c'est à dire sans retenir le corps; M. Fabre^a aussi l'a senti
et invariablement, puisqu'il a cru devoir ajouter à la méthode
de M. Dupouy la manière de faire de contre-extension.
Dans les cas où elles pourroient être nécessaires, sans gêner
aucun muscle du membre luxé. pour le bras, dit M. Fabre,
le corps est retenu par le moyen d'une serviette placée sous
le bras luxé, de manière qu'elle n'appuie point sur les
tendons du grand pectoral, et du grand dorsal. ensuite on tire
par gradation le membre par le poignet, dans la direction
où les muscles sont les plus relâchés. M. Bouteau en
voulant suivre la méthode de M. Dupouy pour réduire
la luxation du bras, a aussi été obligé de faire une
contre-extension en faisant placer sous l'aisselle le pied
d'un homme, tandis que le même homme faisoit l'extension
en tirant par la main le bras luxé. ces deux commentateurs

de la méthode de M.^r Dupoué malgré les succès qu'ils ont
 obtenus n'ont pas suivi l'indication de la nature, qu'ils
 prescrivent cependant eux mêmes! pour réduire les luxations
il faut faire l'extension dans la direction ou les muscles
sont également relâchés. M.^r Fabre faisant tenir le
 corps par le moyen d'une serviette placée sous le bras luxé,
 il doit nécessairement faire l'extension le bras relevé dans
 un plan vertical, i.e. à dire faisant un angle avec le corps.
 M.^r Bouteau fait faire la contre-extension avec le pied sans
 l'aide d'elles; dans l'extension le bras est encore plus rapproché
 du tronc; par conséquent les muscles ne peuvent point
 être également relâchés! par ce que nous avons dit que
 la luxation du bras se fait ^{à peu près} ^{et toujours} en bas, & qu'en
 faisant l'extension, le bras situé dans un plan vertical,
 ou au dessous de cette ligne, la réduction ne pourroit pas
 se faire sans causer une tension, ou des déchirures plus
 ou moins fortes, aux muscles deltoïde, sur-épineux, &
 biceps & à la portion supérieure du ligament capsulaire;
 tandis que toutes les autres parties environnantes de
 l'articulation sont dans le relâchement.

La maxime de relâcher également toutes les parties
 qui environnent une articulation, lorsqu'on fait des extensions
 pour réduire la luxation, est une vérité qui a été
 reconnue par tous ceux qui ont écrit sur les luxations;
 mais je ne connois personne qui ait mis ce principe en
 pratique; c'est pourquoi on a vu des luxations de l'humérus
 n'avoir pas pu être réduites, même en employant les moyens
 les plus violents; tandis qu'aucune ne doit résister en

n'employant que des forces médiocres, (les mains;) est ce que
je vais prouver par l'observation.

1. ob. Le nommé Claude Dupuis âgé de 49 ans, d'une
constitution forte et vigoureuse, natif de Cule en Bugé,
se suspendant d'un arbre, se lura le bras gauche; plusieurs
chirurgiens essayèrent de réduire la luxation sans pouvoir
en venir à bout. Le malade vint à l'Hôtel-Dieu de Lyon
le 4 août 1776, alors la luxation existoit depuis six-
sept jours, la tête de l'humérus étoit en bas, et engagée
sous le cot de l'omoplate. Le lendemain à l'heure de son
pansement du soir: on presuma de M.^r M.^r Garnier, -
Bujourac et Carret, tous trois maîtres en chirurgie de
la ville de Lyon, on essaya de réduire la luxation; -
d'après mes réflexions et les expériences que j'avois faites
sur le cadavre, je proposai un procédé nouveau pour faire
les extençons; M.^r Garnier étoit un vieux chirurgien
qui tenoit à l'ancienne pratique, et comme il faisoit les
fonctions de chirurgien gagnant maîtrise, ou major, qui
étoit absent, je fus obligé de condescendre à ses volontés;
en conséquence il fut fait les extençons et contre-exten-
çons avec les mains et de larges, on étoit brisé ou quatre
pouces d'humérus; pendant les extençons un autre chirurgien
tattoit de faire la conformation, soit avec les mains, -
ou avec une serviette autour du cou, dans l'aisselle de laquelle
étoit embrassé le bras malade près de l'articulation de l'épaule.
Les extençons furent si fortes que je vis un moment au le



malade commençoit à prendre des convulsions, malgré cela on ne pût point déplacer la tête de l'humérus; après plusieurs tentatives inutiles suivant ce procédé, on ~~employa~~ le bâton; ce moyen ne fut pas plus heureux. La machine de Petit fut mise en usage; tout fut sans succès; alors je représentai de nouveau l'avantage des procédés que je proposai, d'autant plus qu'il n'y avoit rien à craindre pour le malade; par ce que je faisois les extensions seules et avec les mains simplement. M. M. Garnier et Buztourac s'en allèrent, croyant que mes tentatives seroient inutiles; mais persuadé dans mon opinion, je fis assoir le malade sur une chaise, ensuite je placai sur l'épaule lésée un grand linge plié un peu étroit, pour qu'il ne portât que sur le bout de l'épaule ou omoplate; quatre de mes confrères, chirurgiens du dit Hôtel-Dieu, en assis par terre, tenoient les bouts de ce linge pour faire la contre-extension. Je placai une autre serviette vers le milieu du corps qui croisoit la première, un autre chirurgien placé ^{partie} du côté opposé à la ~~malade~~, tenoit les deux bouts; celle-ci ne devoit servir qu'à fixer le corps dans le moment des extensions. Je fis placer une table solide près du malade du côté de la luxation, sur laquelle je montai; ensuite je pris le bras malade que j'empoignai avec mes deux mains, vers la partie inférieure ou près du coude, je le relevai en tirant doucement jus qu'à ce qu'il fut près de la tête, ou dans une ligne perpendiculaire avec le corps; alors je fis une extension plus ou moins forte, le malade n'éprouva aucune douleur par ce que l'extension

Se faisoit sur tous les muscles également, & la contre-extension
 n'en étoit aucun par ce qu'elle ne portoit que sur l'épaule.
 Lorsque j'abaissai le bras, M^r. Carret & mes confrères
 furent dans la plus grande surprise de voir que la tête de
 l'humérus étoit rentrée dans la cavité; il y en eut même
 qui dirent que la réduction n'avoit pas pu se faire avec
 si peu d'effort, & qu'il falloit absolument qu'elle eût été
 réduite par les moyens violens qu'on avoit employés auparavant.
 Comme un moyen nouveau ou des choses inconnues paroissent
 impossibles à certaines personnes, Je ne combattis par leur
 opinion quoique ce fait me confirma parfaitement dans la
 mienne. on mit le bras du malade en écharpe, & on couvrit
 toute l'épaule avec un cataplasme de rose, arrosé avec de
 l'eau de vie; ce pansement fut renouvelé une fois ~~par~~
 par jour pendant six jours; ensuite pendant autres six
 jours on fit des embrocations sur toute la partie, avec
 un mélange d'onguent d'althea, l'huile de rose & l'eau
 de vie. pendant tout ce temps le malade faisoit de légers
 mouvemens avec son bras, & le septième jour après la
 réduction il s'en fut parfaitement guéri.

2^e obs.

au mois de Juin 1780, Je fus appelé au Charpenné
 près de Lyon, pour une femme d'environ 35 ans qui
 étoit tombée dans un fossé, & elle s'étoit démise l'épaule;
 en effet Je trouvais cette pauvre malheureuse qui avoit
 une luxation du bras droit, la tête de l'humérus étoit
 placée en devant sous le muscle grand pectoral. Je

J'avais comment étoit arrivé l'accident, afin d'avoir une parfaite
 connaissance de la maladie et pour la guérir avec plus de sûreté.
 Cette femme me raconta qu'elle étoit tombée de côté, en
 travers dans le fossé, et qu'en tombant elle avoit tendu le
 bras pour s'appuyer sur le bord ^{opposé du} du fossé, mais le bras n'ayant
 pas été assez fort pour résister au poids du corps ou à l'impulsion
 de la chute, elle éprouva dans le moment une douleur vive à l'épaule,
 et d'ailleurs elle étoit tombée en devant dans le fond du
 fossé. D'après cela je ne doutai point que dans le moment
 de la chute en travers, ou le bras tendu et appuyé sur le
 bord opposé du fossé, ne peut pas soutenir le poids du corps,
 l'humérus s'éluxa en bas: alors le bras ne pouvant plus faire
 aucune résistance, le corps tomba en devant dans le fond du
 fossé, mais le bras restant appuyé sur le bord du fossé fut
 porté en arrière; voilà précisément ce qui déplaca la tête de
 l'humérus en devant.

Dans le moment où je vis la malade je n'aurais pu faire
 pour maintenir & réduire la luxation; mais persuadé de ma
 méthode j'essayai tout seul. Je fis coucher la malade sur un
 lit un peu bas avec l'attention de placer le bras malade du
 côté du bord; ensuite je plaçai une chaise à côté du même
 bord du lit, mais au dessus de la tête de la malade; avant de
 m'asseoir je commençai par relever le bras en tirant doucement
 en arrière, lorsqu'il fut relevé près de la tête, c'est à dire
 dans une ligne perpendiculaire au corps supposé de bout: alors
 je m'assis et plaçai mon pied gauche, sans soulèvement, sur l'épaule
 malade, pour faire la contre-extension, tandis qu'avec mes deux
 mains je tenais le poignet du bras luxé par où je fis
 l'extension. Je puis assurer que sans un grand effort, ni sans

nature et de remplir le précepte de tous les auteurs, —
 qu'il faut que tous les muscles soient également tendus. il y a
 encore un second avantage et que la contre-extension ne
 porte sur aucun muscle du bras. ainsi, dans tous les cas, —
 on doit réduire la luxation du bras, en le relevant près
 de la tête c'est à dire dans une direction perpendiculaire
 avec le corps; et que l'extension se fasse en tenant le bras
 par la partie inférieure ou par le poignet la réduction
 se fait également; cependant en joignant à cela la contre-
 extension qui porte sur l'épaule.

mais une objection qui paroît toute simple et qu'on
 pourroit faire: la luxation par un accident extraordinaire
 ne pourroit elle pas se faire en haut! cela est possible,
 mais nous avons fait observer qu'elle causeroit des ravages
 plus dangereux que la luxation elle même; et nous en
 avons dit que pour qu'elle put se faire il falloit en
 absolument que le bras fut très rapproché du tronc.
 cette objection sert à confirmer combien il est essentiel
 de savoir dans quelle situation étoit le bras lorsque
 la luxation s'est faite, parceque pour la réduire il
 est absolument nécessaire de remettre le bras dans la
 même situation, afin de trouver moins de résistance
 pour faire les extensions. et pour que la tête de l'humérus
 rentre dans la cavité par où elle est sortie. or! pour
 réduire une luxation en haut il faut faire les
 extensions en bas, le bras très rapproché du tronc;
 dans cette direction les muscles tendus seront relâchés
 et la luxation sera réduite, aussi aisément que nous

ACADEMIE ROYALE
CHIRURGIE
L'ACADEMIE
C
ontient la luxation en bas en faisant les extensions³⁹
en haut; et les extensions seules ramènent la tête dans
la cavité sans le secours de la conformation. ces principes
doivent être mis en pratique pour toutes les luxations,
et si le succès répond à mes espérances, j'en serai trop
heureux d'avoir contribué aux progrès de l'art et au
soulagement de l'humanité.

De Lyon le 11. avril 1785.



causes de douleur a la malade, je réduisis la luxation. la
réduction faite, je plaçai le bras dans une écharpe & je
baptisai le pault avec un mélange de parties égales de leau
de rûp & de leau, que je saturai avec du sel commun. le
soir la malade fut saignée du bras; le pansement fut fait
deux fois par jour, pendant dix jours; au bout duquel
temps, la malade fut parfaitement guérie.

3. obs.

au mois de février 1783, je fus appelé chez une
sage femme, pour voir l'enfant d'une demoiselle qu'elle avoit
avortée la veille; je levai le bras droit de cet enfant
luxé en bas; je demandai a la matrone si elle savoit la
cause de cette luxation, elle dit que non: mais que l'enfant
étoit venu par les pieds & qu'elle avoit eu beaucoup
de peine a sortir la tête; pour en venir a bout elle avoit
été obligée de faire de grands efforts pour degager les bras: c'est
a quoi j'attribuai la cause de la luxation. Je la réduisis
fort aisement, en tirant d'une main le bras luxé relevé près
de la tête, tandis qu'avec l'autre main je retenois le
corps. pendant quelques jours ensuite, on eut l'attention
de bien ranger le bras en maillant l'enfant. il est
parfaitement guéri & se sert de son bras comme s'il
n'avoit jamais rien eu.

Corollaire

Ces trois observations prouvent que quoique la
tête de l'enfant aye été placée en différents endroits,
malgré cela la luxation s'étoit toujours faite en bas &
toutes ont été réduites par le même procédé. il est
vrai que la direction des extensions que j'ay employées
a non seulement l'avantage de suivre l'indication de

...the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...

... the ... of ...